Projekt SattGrün

Grünland im agrarmeteorologische Informationssystem ISABEL des DWD

Dr. Cathleen Frühauf, Juliane Kellner

Deutscher Wetterdienst
Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung Braunschweig

Gefördert durch:

aufgrund eines Beschlusses
des Deutschen Bundestages

eingesetzte Modelle

- Modelle zur Berechnung der Bodenfeuchte (AMBAV und MONICA)
- Vegetationsbeginn im Dauergrünland („Ergrünen“)
- Nutzung der Schnitt-Detektion über Satellit → regionalisierte Information für die Bodenfeuchte-Modellierung (Naturräume)
- Schnittwürdigkeit
- Heutrocknung
- Informationen zur Befahrbarkeit
- zur Verfügung stehende Informationen im Web-Portal des DWD

ISABEL-Portal für die Bundesländer

DWD unterstützt Länder bei der Vermeidung von Umweltschäden durch die Landwirtschaft mit kostenfreien, qualitativ hochwertigen agrarmeteorologischen Informationen

Nutzung des Umstandes, dass Landwirte täglich auf die agrarmeteorologischen Informationen zugreifen, um eigene wichtige aktuelle Botschaften schnell zu transportieren

Durch Kooperation mit DWD können auch für die Länder aktuelle und künftige Fragestellungen integriert werden

geschlossene Nutzergruppe für Landwirte

SattGrün - Abschlusskonferenz - 25.02.2021

Grünland im ISABEL-Portal: Vegetationsbeginn

Düngungstermin im Frühjahr sollte möglichst nahe am Vegetationsbeginn liegen, um Auswaschung von Nährstoffen zu vermeiden.

Phänologische Beobachtungen

Dauergrünland: Ergrünen 2019

Deutschland

1. Meldung: 1. Januar letzte Meldung: 9. April Meldequote: 89 %

Etwa 25 % der ausgewählten Grünlandfläche zeigt frisches Grün – das Blattwachstum der Gräser hat begonnen.

P. Ernst und E.-G. von Loeper (1976):

Temperatursummenmodell zur Prognose des Vegetationsbeginns von Dauergrünland

→ Anwendung im gemäßigten Klimaraum

Grünland im ISABEL-Portal: Vegetationsbeginn

ISABEL – Station: Braunschweig

Wachstumsbeginn Grünland							
Wärmesumme [°C] nach Ernst und Loeper	39	39	39	39	39	39	39
	Heute	Di 9.2.	Mi 10.2.	Do 11.2.	Fr 12.2.	Sa 13.2.	So 14.2.

 200

- Der aus Wärmesumme ermittelter Termin stimmt gut mit der phänologischen Beobachtung des „Ergrünens“ von Grünlandbeständen überein
- einzelne Jahre mit stärkerer Abweichung → meist besonders strahlungsreiche Frühjahre

- Das phänologische Stadium „Ergrünen“ wird auf dem 1x1km-Raster berechnet → Erreichen der 200-Gradsumme nach Ernst und von Loeper (1976)
- Nutzung des Termins für den Start der Bestandsentwicklung in AMBAV
- Erste Überprüfung wurden an der HUB mit dem aus Satellitendaten identifiziertem „Ergrünen“ wurden durchgeführt.
- Nach Abschluss der Arbeiten ist eine u.U. notwendige Anpassung der Temperatursumme in bestimmten Regionen möglich.

Vorteil: Einfluss des jährlich variablen Vegetationsbeginn wird bei der Bodenfeuchte-Modellierung berücksichtigt.

Grünland-Modellierung: Bereitstellung durch HUB

- Grünland Management als regionalisierter Modell-Input
- Modell Auflösung 1 km² Zellen
- Grünland Management nicht homogen
- Aggregation auf 90 Naturräume

Grünland-Modellierung: Bereitstellung durch HUB

- Anzahl der Grünlandschnitte variiert innerhalb Deutschlands
- Entfernung der zeitlich zu nah beieinander liegenden Mahd-Terminen → Reduktion der Anzahl an Schnitten in den Naturräumen
- Nutzung der mittleren Schnitt-Terminen in der Modellierung von AMBAV und MONICA

- Anpassung der AMBAV-Parametrisierung für intensiv genutztes Dauergrünland
- Vor Projektende Wechsel auf eine neue Modell-Version in der Routine-Produktion des DWD
- zusätzliche Neuparametrisierung notwendig

Vorteile:

- Nutzung einer einheitlichen Rasterversion des Modells für verschiedene Kulturen
- Verwendung der Böden aus der BÜK200
 - zusammengeführt auf das verwendete 1x1km-Raster
- Ausgabe stündlicher Modellergebnisse
- Bodenfeuchte in 10cm-Schichten bis in eine Tiefe von 2m
 - Betrachtung einzelner Schichten und unterschiedlicher Bereiche möglich
- Darstellung in ISABEL (aktuell: Berechnungen für Stationen)
- Darstellung in Kartenform im neuen Bodenfeuchte-Monitor

Grünland im ISABEL-Portal: AMBAV

bisher:
stationsweise Berechnungen
für zwei Modell-Böden
(leichter und schwerer Boden)

Bodenwasserhaushalt (0-90 cm)

Gras, leichter Boden

Bodenfeuchte [% nFK]							
0 - 10 cm	103	99	97	95	93	91	88
10 - 20 cm	101	99	97	95	94	91	88
20 - 30 cm	96	96	95	94	93	91	89
30 - 60 cm	96	95	95	94	94	93	91
60 - 90 cm	100	99	99	99	99	98	97
Sickerwasser/ kapillarer Aufstieg [mm]	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1
Bodenwasser [mm]							
pflanzenverfügbar	238	236	234	232	231	228	223
freier Speicher	4	6	8	10	11	14	19
	Heute	Mi 1.4.	Do 2.4.	Fr 3.4.	Sa 4.4.	So 5.4.	Mo 6.4.

	10 30 50 80 95 100 105 % nFK

Grünland im ISABEL-Portal: AMBAV

neu:
Berechnungen mit realen Böden für Stationen und auf dem Raster

Bodenfeuchte-Monitor

Bodenfeuchtemonitor

Hier wird kurz beschrieben, was diese Seite anbietet. Sollte vielleicht nur zwei oder drei Zeilen sein.

Interaktiver Bodenfeuchtemonitor

Hier wird kurz beschrieben, was diese Seite anbietet. Sollte vielleicht nur zwei oder drei Zeilen sein.

[Link zur Interaktiven Anwendung](#)

neu:

- Webseite ist im Aufbau → Freischaltung 2021
- schichtweise Darstellung von Rasterdaten der Bodenfeuchte für verschiedene Kulturen (Winterweizen, Mais, Grünland)

Test-Webseite

Bodenfeuchte-Monitor

Weitere Bodenfeuchte Information

Niederschlagsdefizit

Hier wird kurz beschrieben, was diese Seite anbietet. Sollte vielleicht nur zwei oder drei Zeilen sein. Länger sollte nicht sein, sodass der Nutzer schnell die Produkte sehen kann. Hier wird kurz beschrieben, was diese Seite anbietet. Sollte vielleicht nur zwei oder drei Zeilen sein. Länger sollte nicht sein, sodass der Nutzer schnell die Produkte sehen kann.

zusätzlich:

- über Bodentiefen gemittelte Karten (z.B. 0-60cm, 0-90cm)
- Bodenwasser (Vorrat, Speicher)
- Bodenfeuchteanomalie (Abweichung vom langjährigen Mittelwert)
- Niederschlagsabweichung (Defizit / Überschuss) für aktuelles hydrologisches Jahr im Vergleich zu 1991-2020
- Links zu DWD-Seiten zum Thema Dürre / Trockenheit

Grünland im ISABEL-Portal: FOPROQ

- **F**orage **P**ROduction **Q**uality (Herrmann et al., 2005)
- entwickelt an der Christian-Albrechts-Universität Kiel
- Reifeprüfung Grünland
- **Ertragsmodul:** täglicher Trockenmassezuwachs als Produkt aus relativer Wachstumsrate und vorhandener Biomasse
- Annahme: rel. Wachstumsrate zu Beginn einer Zuwachsperiode am größten
- **Qualitätsmodul:** Simulation von Nettoenergieleistung Laktation (NEL), Rohprotein, Rohfasergehalt
- Basis: Qualitätsveränderungsraten abgeleitet von Temperatur, Bodenfeuchte, Tageslänge, Einstrahlung

Grünland im ISABEL-Portal: FOPROQ

Grünland im ISABEL-Portal: FOPROQ

ISABEL – Station: Braunschweig

Grünlandertrag							
Ergrünen: 11. März							
Ertrag, leichter Boden [dt/ha]	26.5	27.9	28.9	29.9	31.2	32.5	33.6
Ertragszunahme, leichter Boden [dt/ha]	1.4	1.4	1	1	1.2	1.3	1.1
Ertrag, schwerer Boden [dt/ha]	27.4	28.9	29.9	31	32.3	33.8	35
Ertragszunahme, schwerer Boden [dt/ha]	1.6	1.5	1.1	1.1	1.3	1.4	1.2
Rohfasergehalt [%]	15.8	16	16.2	16.5	16.8	17.1	17.4
NEL [MJoule/kg]	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.4	7.4
Rohprotein [%]	27.2	26.8	26.4	25.9	25.5	25	24.5
	Heute	Sa 27.4.	So 28.4.	Mo 29.4.	Di 30.4.	Mi 1.5.	Do 2.5.

optimal:

← 23-28 %TM

← 6.2-6.4 MJ/kgTM

← 12-18 %TM

MONICA output, DOY: 115

Einbindung des ZALF-Modells
MONICA in die Routineproduktion
des DWD ist vorbereitet

➔ Wechsel auf die jeweils neuste
Modellversion in Absprache mit dem
ZALF

Information zur Biomasse-Entwicklung:

➔ weiterer Hinweis für die
Schnittwürdigkeit

Grünland-Modellierung: AMBAV und MONICA

Vergleich der Bodenfeuchte-Modellierung

- erste Tests laufen für die Vergleichsstandorte
- Beispiel: Braunschweig

in der Vegetationsperiode:

- wöchentliche Messung der Bodenfeuchte in einem Weidelgras-Bestand (gravimetrische Methode)

Grünland im ISABEL-Portal: Heutrocknung

Überprüfung des vorhandenen Heutrocknungsmodells

Heutrocknung

Heutrocknungsgrad [%]

Niederschlag [mm]

1. Silageschnitt am ZAMF 22.05.2019

2. Silageschnitt am ZAMF 01.07.2019

Grünland im ISABEL-Portal: Befahrbarkeit

- Darstellung der Befahrbarkeit von Grünlandflächen in Abhängigkeit von der modellierten Bodenfeuchte
- Durch die zurückliegenden Trockenjahre konnten durch die Projektpartner nicht alle notwendigen Messungen zur Parametrisierung bei hohen Bodenfeuchten durchgeführt werden.
- Vorbereitung der umfangreichen Auswahlmenüs in ISABEL → der Landwirt wählt zur geplanten Managementmaßnahme die Traktor/Schlepper-Kombination zur Bestimmung der Belastungsklassen aus
- Bei Vorliegen der Parametrisierung kann die Befahrbarkeit für Grünlandflächen in ISABEL freigeschaltet werden.

Regional und nach Kulturart differenzierte Zeiten:
Bodenbearbeitung
Aussaat, Ernte,
Düngung,
Pflanzenschutz

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Fragen ?

Dr. Cathleen Frühauf
Deutscher Wetterdienst
Zentrum für Agrarmeteorologische Forschung